

# ZAGOR® PARAFFINATO

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT 2014/00190/AUT

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)	g 0,005
Denatonium Benzoato	g 0,001
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a 100g

## FORMULAZIONE

Esca rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato da g 20 con sezione quadrata, colore blu, aroma frutta.

Il blocco è costituito da una miscela bilanciata di sostanze alimentari con semi interi di cereali, molto appetibili ai roditori, amalgamata in ridotta matrice paraffinica, molto resistente all'umidità e al temporaneo contatto con l'acqua.

## INFESTANTI BERSAGLIO

ZAGOR® PARAFFINATO viene facilmente accettato e consumato da tutte le specie di roditori comunemente rinvenibili nei nostri ambienti: *Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico) anche se posto in competizione con fonti alternative di alimento.

## AMBIENTI D'USO

ZAGOR® PARAFFINATO è autorizzato per l'uso all'interno e intorno agli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

## ATTREZZATURE

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici e dalla dispersione nell'ambiente. Se utilizzati in esterno, gli erogatori devono essere posizionati lungo recinzioni, perimetri esterni e pareti esterne in corrispondenza porte e portoni. I contenitori devono essere disposti in modo da minimizzare il rischio di ingestione involontaria da parte di bambini o animali non bersaglio e posti in luoghi a loro inaccessibili. Il contenitore deve essere ancorato adeguatamente e avere l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio.

## DOSI CONSIGLIATE

Topo domestico:	40 g x 100 mq
Ratto grigio:	60-100 g x 100 mq
Ratto nero:	60-100 g x 100 mq

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto secondo i dosaggi indicati. Segnalare la zona interessata dal trattamento Indicando rischio avvelenamento e misure primo soccorso. Non destinato ad un uso permanente, durante l'impiego eseguire frequenti ispezioni e sostituire le esche consumate. Utilizzare guanti appropriati per manipolare il prodotto.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini

**P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

**P280** Indossare guanti protettivi

**P301+310** IN CASO DI INGESTIONE contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un

medico

**P401** Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

**P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme vigenti

## NOTE

Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non utilizzare in agricoltura. Non contaminare persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Conservare nel contenitore originale.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda: RE.008-14.09.2018



BIOCIDA



ANTIDOTO Vitamina K1

## SPECIE BERSAGLIO



## DESTINAZIONE D'USO



## PRODOTTI CORRELATI



AEGIS MOUSE



ALIMENTA BEST BOX



ALIMENTA COMBI PLUS



ALIMENTA FREE



ALIMENTA DUPLEX




ALIMENTA RAT



ALIMENTA SIMPLE



ALIMENTA SIDE



ALIMENTA TUBOX



Etichetta bianca-rossa